

LA VEILLE DE VOTRE INTERVENTION

Téléphonez-nous afin de connaître votre heure d'entrée ainsi que les consignes relatives à l'intervention.

Téléphonez la veille, c'est à dire le :

Dinant :

- +32 82 21 25 05 entre 14h et 16h.

Sainte-Elisabeth :

- + 32 81 72 05 18 entre 14h et 16h.

LE JOUR DE VOTRE INTERVENTION

A Dinant

- Inscription à l'accueil central.

A Sainte-Elisabeth

- Inscription au secrétariat de l'**Hôpital de jour Chirurgical**.
- Suivez la route 331.

Munissez-vous de votre carte d'identité et, éventuellement, de vos documents d'assurance hospitalisation.

Lors de votre sortie, la conduite de votre véhicule est interdite, et ce, jusqu'au lendemain compris. Prévoyez une personne pour vous reconduire.

Un antidouleur vous sera prescrit, n'hésitez pas à le prendre.

A SAINTE-ELISABETH

Si vous êtes en traitement de chimiothérapie, il est nécessaire de réaliser une prise de sang dans le service de Chimiothérapie 1 heure avant votre entrée à l'Hôpital de jour Chirurgical.

Service d'Oncologie - Hématologie

LA CHAMBRE IMPLANTABLE OU PORT-À-CATH (PAC)

📍 Dinant & Sainte-Elisabeth



INFOS

Service d'Oncologie - Hématologie

Site de Dinant (Saint-Vincent)

Rue Saint-Jacques, 501 - 5500 Dinant

Hôpital de jour

☎ +32 82 21 24 75

Site de Sainte-Elisabeth

Place Louise Godin, 15 - 5000 Namur

Hôpital de jour Chirurgical

☎ +32 81 72 05 18

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question avant ou après l'intervention.



DE QUOI S'AGIT-IL ?

La chambre implantable ou Port-à-Cath (PAC) est constituée d'un boîtier (1) et d'un cathéter (2) placés sous votre peau, le tout relié à votre réseau veineux profond.



POURQUOI LE PLACER ?

Il permet d'éviter de fragiliser vos veines superficielles.

Il pourra dès lors être utilisé pour réaliser vos prises de sang, chimiothérapies, transfusions, etc.

LA MISE EN PLACE

L'acte s'effectue la plupart du temps en ambulatoire à la Clinique chirurgicale d'un Jour.

L'appareil est placé au Bloc opératoire, sous anesthésie locale, avec ou sans sédation (légère anesthésie après laquelle le réveil est immédiat).

L'opération dure en moyenne une heure. Selon l'appréciation du chirurgien, un contrôle radiologique peut être demandé après l'intervention.

QUELS SOINS ?

Lors de votre sortie de l'hôpital, le chirurgien ou son équipe infirmière vous donneront les consignes concernant les soins à effectuer à votre domicile.

DATE DE LA MISE EN PLACE DU PAC

Rendez-vous le :

.....

Mise en place par le Dr :

.....

Arrêt des anticoagulants :


..... jours avant l'intervention
(selon la prescription médicale)



Concrètement, le boîtier est placé sur le haut de votre torse (soit à droite, soit à gauche).

Le cathéter est introduit au niveau de votre cou, dans la veine jugulaire ou sous-clavière.

Le PAC peut être directement utilisé après sa mise en place.



DANS LES 24 À 48 HEURES APRÈS L'INTERVENTION...

Il y a un risque de douleurs au niveau du cou et de l'épaule. Un gonflement et/ou un hématome peuvent apparaître au niveau de la cicatrice. Ceux-ci disparaîtront au bout de 4 à 5 jours.

Évitez des mouvements brusques de l'épaule, les premiers jours. Ne prenez pas de bain ni de douche tant que les fils ne sont pas résorbés.

Si ces signes persistent ou si d'autres symptômes apparaissent, tels que de la douleur, une rougeur, de la température (38°C), reprenez contact avec votre médecin référent (chirurgien ou oncologue) ou votre coordinatrice de soins oncologiques.

ULTÉRIEUREMENT...

Le PAC restera en place aussi longtemps que nécessaire.

Cela n'empêchera pas les examens tels que IRM, scanner,...

Il pourra être retiré après le traitement, en consultation chirurgicale et sous anesthésie locale.