

Y a-t-il un risque de surdosage?

La pompe est programmée et pourvue d'un système de sécurité qui évite tout surdosage. Seul le patient est autorisé à utiliser la PCA.

Y a-t-il un risque de devenir dépendant à l'antidouleur?

Il n'y a aucun risque. Vous bénéficierez de la pompe PCA pour la période postopératoire qui est relativement courte.

Le service de prise en charge de la douleur postopératoire

Une à deux fois par jour, vous recevrez la visite d'un membre de notre équipe.

Nous vous demanderons d'évaluer l'intensité de votre douleur à l'aide d'une réglette spécifique allant de l'absence de douleur à la douleur maximale imaginable.

Cette visite nous permettra au besoin d'améliorer votre confort et de traiter efficacement d'éventuels inconvénients.



INFORMATIONS



SERVICE D'ANESTHÉSIE - ANALGÉSIE AIGUË

L'équipe d'analgésie aiguë postopératoire se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

 INFORMATION À L'ATTENTION
DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE

Service d'Anesthésie - Analgésie aiguë

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE

 Site
GODINNE



E.R. Benoît Libert | CHU UCL Namur asbl - Av. Dr Gaston Thérasse 1, B5530 Yvoir (Belgique) - BE 0641733885 - RPM Namur | Ne pas jeter sur la voie publique.

© CHU UCL Namur
Avenue Dr Gaston Thérasse, 1 - 5530 Yvoir
BE 0641733885 | RPM Namur

15/08/2021 | com-029-02



chuuclnamur.be




Vous allez bénéficier d'une intervention chirurgicale et vous craignez d'avoir mal.

Il est important que vous sachiez que l'on peut traiter la douleur dès son apparition.

Une prise en charge efficace de la douleur (analgésie) vous apportera un certain confort et facilitera votre convalescence.

Depuis plus de 25 ans, le service d'anesthésie-Analgésie (gestion de la douleur) du CHU UCL Namur - Site de Godinne vous propose divers moyens de prise en charge de la douleur, dont le principal est basé sur le principe dit « PCA » ou Patient Contrôle Analgésie.

C'est donc vous, patient, qui décidez du moment d'administration du médicament qui calmera votre douleur (analgésique) grâce à un appareil programmé appelé pompe PCA.

Comment utiliser la pompe PCA ?

Dès que vous avez mal, il vous suffit d'exercer une pression assez forte sur le bouton poussoir (un bip sonore accompagne une pression réussie), sans attendre que la douleur ne soit trop importante.

Ainsi, la pompe PCA vous délivrera, en toute sécurité, la dose programmée d'antidouleur.

N'hésitez pas à utiliser votre pompe, quelques minutes, avant un soin, une mobilisation, des exercices de kinésithérapie, etc.

Quelles sont les différentes techniques de prise en charge de la douleur ?

3 techniques sont possibles selon l'endroit où l'on injecte l'antidouleur.

1. L'analgésie par PCA intraveineuse

Elle permet l'administration en quelques minutes grâce à un cathéter placé dans une veine, d'un antidouleur lors de la pression du bouton poussoir.

Cette technique ne fonctionne pas en débit continu.

2. L'analgésie par PCA péridurale

Elle permet l'administration en continu d'un antidouleur grâce à un cathéter placé dans votre dos.

L'anesthésiste vous expliquera comment il placera ce cathéter avant l'intervention. Vous aurez la possibilité d'utiliser le bouton poussoir pour recevoir des doses d'antidouleur supplémentaires si une douleur apparaissait ou se majorait.

3. L'analgésie plexique

Elle permet l'administration en continu d'un anesthésique local, à effet antidouleur, grâce à un cathéter placé près des nerfs concernés par la chirurgie.

L'anesthésiste vous expliquera comment il placera ce cathéter avant l'intervention. Des antidouleurs complémentaires seront prescrits. On n'utilise pas le bouton poussoir avec cette technique, exclusivement en débit continu.

Qui décide de la méthode ?

Votre anesthésiste vous proposera une technique analgésique bien adaptée à votre intervention lors de la consultation préopératoire. La décision sera bien sûr prise avec votre accord.

Toutefois l'anesthésiste pourrait, s'il le juge nécessaire, modifier ce choix en fonction d'impératifs médicaux.

Quand débute le traitement ?

Dès votre arrivée en salle de réveil, la PCA sera mise en route et restera à votre disposition dans votre chambre.

Combien de temps allez-vous utiliser la PCA ?

En fonction de votre opération et de votre douleur, l'équipe d'analgésie postopératoire, en collaboration avec votre chirurgien, déterminera combien de temps vous pourrez utiliser la PCA.

Lorsque votre analgésie PCA sera interrompue, un traitement antidouleur relais sera prévu pour assurer votre confort.

Toute l'équipe de prise en charge de la douleur, en collaboration avec les infirmier(ère)s de votre service, cherchera à rendre votre séjour le plus confortable possible pour vous permettre un prompt rétablissement.

N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions.