

Vos médicaments

Anticoagulants

En tant que patient, et avec l'aide de nos équipes soignantes, vous avez un rôle actif à jouer dans la bonne gestion de vos médicaments.

Retrouvez ici les documents informatifs élaborés par nos pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec nos médecins.



Ces fiches d'informations sont mises à disposition des patients du CHU UCL Namur. Leur utilisation doit faire l'objet d'un accompagnement par nos équipes médicales, en particulier lors de la première prescription du médicament concerné par la fiche.

CLIQUEZ SUR LE NOM DU MÉDICAMENT
POUR ACCÉDER À SA FICHE INFORMATIVE

CLEXANE®	26
ELIQUIS® FA	4
ELIQUIS® POST-OP	6
ELIQUIS® TEV	2
INNOHEP®	24
LIXIANA® FA	8
LIXIANA® TEV	10
PRADAXA® FA	14
PRADAXA® POST-OP	16
PRADAXA® TEV	12
RIVAROXABAN® FA	22
XARELTO®	18
RIVAROXABAN® POST-OP	20
XARELTO®	28
RIVAROXABAN® TEV	30
SINTROM® FA / VALVE	
SINTROM® TEV	

INFORMATIONS

Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.



Eliquis® **TEV**

(apixaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : **10** mg 2x/jour du au
(durée totale 7 jours)

Ensuite mg 2x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 7750000 ou 8790000
(à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Eliquis®?

L'apixaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Détruire ou empêcher la formation d'un caillot de sang dans une veine et sa migration au niveau des poumons.

Comment prendre Eliquis®?

- ✦ Les comprimés d'apixaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez l'apixaban matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Essayez de respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises.
- ✦ Si nécessaire, les comprimés d'apixaban peuvent être écrasés et mélangés avec de l'eau, du jus de pomme ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✦ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Eliquis®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✦ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✦ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Eliquis®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'apixaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ✱ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✱ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✱ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise d'apixaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✱ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'apixaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✱ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✱ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✱ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.



Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.

Eliquis® FA

(apixaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :mg 2x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 6660000
ou 10220000 (à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Eliquis®?

L'apixaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Empêcher la formation d'un caillot de sang au niveau du cœur et sa migration au niveau du cerveau (AVC).

Comment prendre Eliquis®?

- ✦ Les comprimés d'apixaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez l'apixaban matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Essayez de respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises.
- ✦ Si nécessaire, les comprimés d'apixaban peuvent être écrasés et mélangés à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✦ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Eliquis®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✦ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✦ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Eliquis®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'apixaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC).

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 112 SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :

- ✧ **faiblesse**, perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la parole**, difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la vision**, problème de vision soudain, même temporaire ;
- ✧ **mal de tête soudain**, intense et inhabituel.

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✧ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise d'apixaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✧ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'apixaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✧ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✧ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✧ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.



Eliquis® Post-op

(apixaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : **2,5** mg 2x/jour

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 6050000 en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Eliquis®?

L'apixaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Empêcher la formation d'un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins après une opération du genou ou de la hanche.

Comment prendre Eliquis®?

- ✦ Les comprimés d'apixaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez l'apixaban matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Essayez de respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises.
- ✦ Si nécessaire, les comprimés d'apixaban peuvent être écrasés et mélangés avec de l'eau, du jus de pomme ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✦ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Eliquis®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✦ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✦ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Eliquis®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'apixaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ✶ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✶ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✶ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise d'apixaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✶ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'apixaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✶ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✶ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✶ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : ***chuucnamur.be/vos-medicaments***.

The logo of the Association Française des Pharmaciens Hospitaliers (AFPHB) is located in the bottom right corner. It consists of a light blue circle containing the acronym 'AFPHB' in a stylized, bold, light blue font. Below the acronym is a small, light blue icon of a mortar and pestle.

Lixiana® FA

(edoxaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :mg 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 8370000 en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Lixiana®?

L'edoxaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✧ Empêcher la formation d'un caillot de sang au niveau du cœur et sa migration au niveau du cerveau (AVC).

Comment prendre Lixiana®?

- ✧ Les comprimés d'edoxaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✧ **Prenez l'edoxaban tous les jours environ à la même heure.** Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre votre comprimé d'edoxaban.
- ✧ Si nécessaire, les comprimés d'edoxaban peuvent être écrasés et mélangés à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✧ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Lixiana®?

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✧ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Lixiana®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'edoxaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC).

- ❖ **faiblesse**, perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire ;
- ❖ **trouble de la parole**, difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire ;
- ❖ **trouble de la vision**, problème de vision soudain, même temporaire ;
- ❖ **mal de tête soudain**, intense et inhabituel.

- ✦ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✦ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise d'edoxaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✦ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'edoxaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✦ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✦ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✦ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : ***chuucnamur.be/vos-medicaments***.

The logo of the Association Française des Pharmaciens Hospitaliers (AFPHB) is located in the bottom right corner. It consists of a light blue circle containing the acronym 'AFPHB' in a stylized, rounded font. Below the acronym is a small icon of a speech bubble with a tail pointing towards the bottom right.

Lixiana® **TEV**

(edoxaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :mg 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 8380000 ou 8390000
(à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Lixiana®?

L'edoxaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✧ Détruire ou empêcher la formation d'un caillot de sang dans une veine et sa migration au niveau des poumons.

Comment prendre Lixiana®?

- ✧ Les comprimés d'edoxaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✧ **Prenez l'edoxaban tous les jours environ à la même heure.** Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre votre comprimé d'edoxaban.
- ✧ Si nécessaire, les comprimés d'edoxaban peuvent être écrasés et mélangés à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✧ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Lixiana®?

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✧ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Lixiana®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'edoxaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ❖ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ❖ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ❖ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise d'edoxaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ❖ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'edoxaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ❖ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ❖ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ❖ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

i

1 Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

2 Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.



Pradaxa® TEV

(dabigatran)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : mg 2x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 7510000 ou 8100000

(à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Pradaxa®?

Le dabigatran est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Détruire ou empêcher la formation d'un caillot de sang dans une veine et sa migration au niveau des poumons.

Comment prendre Pradaxa®?

- ✦ Les gélules de dabigatran doivent être avalées avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez le dabigatran matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Essayez de respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises.
- ✦ **Les gélules de dabigatran ne peuvent pas être ouvertes, mâchées ou écrasées.**
- ✦ Conservez les gélules à température ambiante, dans leur plaquette en aluminium.

Que faire si vous avez oublié Pradaxa®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✦ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✦ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Pradaxa®?

A côté de ses effets bénéfiques, le dabigatran peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ✦ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✦ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de dabigatran, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✦ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du dabigatran. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✦ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✦ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✦ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.



Pradaxa® FA

(dabigatran)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : mg 2x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 6270000 en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Pradaxa®?

Le dabigatran est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✧ Empêcher la formation d'un caillot de sang au niveau du cœur et sa migration au niveau du cerveau (AVC).

Comment prendre Pradaxa®?

- ✧ Les gélules de dabigatran doivent être avalées avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✧ **Prenez le dabigatran matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Essayez de respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises.
- ✧ **Les gélules de dabigatran ne peuvent pas être ouvertes, mâchées ou écrasées.**
- ✧ Conservez les gélules à température ambiante, dans leur plaquette en aluminium.

Que faire si vous avez oublié Pradaxa®?

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✧ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Pradaxa®?

A côté de ses effets bénéfiques, le dabigatran peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC).

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 112 SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :

- ✧ **faiblesse**, perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la parole**, difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la vision**, problème de vision soudain, même temporaire ;
- ✧ **mal de tête soudain**, intense et inhabituel.

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✧ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de dabigatran, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✧ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du dabigatran. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✧ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✧ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✧ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.



Pradaxa® Post-op

(dabigatran)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : **2** gélule(s) de mg 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 5220100 ou 5220200

(à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Pradaxa®?

Le dabigatran est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Empêcher la formation d'un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins après une opération du genou ou de la hanche.

Comment prendre Pradaxa®?

- ✦ Les gélules de dabigatran doivent être avalées avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez le dabigatran matin et soir, tous les jours environ aux mêmes heures.** Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre le dabigatran.
- ✦ **Les gélules de dabigatran ne peuvent pas être ouvertes, mâchées ou écrasées.**
- ✦ Conservez les gélules à température ambiante, dans leur plaquette en aluminium.

Que faire si vous avez oublié Pradaxa®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Il est recommandé de poursuivre le dabigatran à la dose quotidienne habituelle le lendemain à la même heure.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Pradaxa®?

A côté de ses effets bénéfiques, le dabigatran peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexplicable.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ✱ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✱ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✱ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de dabigatran, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✱ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du dabigatran. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✱ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✱ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✱ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.

The logo of the Association Française des Pharmaciens Hospitaliers (AFPHB) is located in the bottom right corner. It consists of a light blue circle containing the acronym 'AFPHB' in a stylized, bold, light blue font. Below the acronym is a small, light blue icon of a speech bubble or a drop with a tail.

Rivaroxaban®

Post-op

(rivaroxaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : **10** mg 1x/jour

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 5150000 en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Rivaroxaban®?

Le rivaroxaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Empêcher la formation d'un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins après une opération du genou ou de la hanche.

Comment prendre Rivaroxaban®?

- ✦ Les comprimés de rivaroxaban doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ✦ **Prenez le rivaroxaban tous les jours environ à la même heure.** Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre le rivaroxaban.
- ✦ Si nécessaire, le comprimé de rivaroxaban peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✦ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Rivaroxaban®?

- ✦ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✦ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✦ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✦ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✦ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Rivaroxaban®?

A côté de ses effets bénéfiques, le rivaroxaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ✦ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✦ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✦ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✦ Des selles de couleur noire ;
- ✦ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✦ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexplicable.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ✱ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✱ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✱ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de rivaroxaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✱ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du rivaroxaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✱ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✱ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✱ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.

The logo of the Association Française des Pharmaciens Hospitaliers (AFPHB) is located in the bottom right corner. It consists of a light blue circle containing the acronym 'AFPHB' in a stylized, bold, light blue font. Below the acronym is a small, light blue icon of a speech bubble or a drop with a tail.

Rivaroxaban® TEV

Xarelto®

(rivaroxaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : **15** mg 2x/jour du au
(durée totale 21 jours)

Ensuite mg 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 6390000 ou 7450000
(à entourer) en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Rivaroxaban®?

Le rivaroxaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ❖ Détruire ou empêcher la formation d'un caillot de sang dans une veine et sa migration au niveau des poumons.

Comment prendre Rivaroxaban®?

- ❖ Les comprimés de rivaroxaban doivent être avalés avec un verre d'eau, **au cours d'un repas**.
- ❖ Prenez le rivaroxaban tous les jours environ à la même heure. Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre le rivaroxaban.
- ❖ Si nécessaire, le comprimé de rivaroxaban peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ❖ Conservez les comprimés à température ambiante.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Que faire si vous avez oublié Rivaroxaban®?

- ❖ Lors du traitement à **2 prises par jour**, prenez immédiatement le comprimé oublié pour assurer une prise de 30 mg/jour. Dans ce cas, il est possible de prendre simultanément deux comprimés de 15 mg.
- ❖ Lors du traitement à **1 prise par jour** :
 - si moins de 12 heures* se sont écoulées après l'heure habituelle de prise, prenez votre médicament ;
 - si plus de 12 heures* se sont écoulées après l'heure habituelle de prise, ne prenez pas votre comprimé ce jour-là.
- ❖ Poursuivez normalement votre traitement les jours qui suivent.
- ❖ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Rivaroxaban®?

A côté de ses effets bénéfiques, le rivaroxaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ :

- ❖ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ❖ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ❖ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ❖ Des selles de couleur noire ;
- ❖ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ❖ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

- ❖ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ❖ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ❖ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de rivaroxaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ❖ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du rivaroxaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ❖ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ❖ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ❖ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuucnamur.be/vos-medicaments.



Rivaroxaban® FA Xarelto®

(rivaroxaban)



Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : mg 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Attestation de remboursement 6330000 en ordre: Oui/Non

Date de fin de l'attestation :

Pourquoi prenez-vous Rivaroxaban®?

Le rivaroxaban est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✧ Empêcher la formation d'un caillot de sang au niveau du cœur et sa migration au niveau du cerveau (AVC).

Comment prendre Rivaroxaban®?

- ✧ Les comprimés de rivaroxaban doivent être avalés avec un verre d'eau, **au cours d'un repas**.
- ✧ Prenez le rivaroxaban tous les jours environ à la même heure. Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre le rivaroxaban.
- ✧ Si nécessaire, le comprimé de rivaroxaban peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou de la compote de pommes immédiatement avant utilisation.
- ✧ Conservez les comprimés à température ambiante.

Que faire si vous avez oublié Rivaroxaban®?

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✧ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Rivaroxaban®?

A côté de ses effets bénéfiques, le rivaroxaban peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC).

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 112 SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :

- ✧ **faiblesse**, perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la parole**, difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire ;
- ✧ **trouble de la vision**, problème de vision soudain, même temporaire ;
- ✧ **mal de tête soudain**, intense et inhabituel.

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✧ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement (médecins, chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pharmaciens, infirmiers à domicile) de la prise de rivaroxaban, notamment lors de soins avec risque de saignements (ex : soins dentaires) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✧ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du rivaroxaban. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien(ne).
- ✧ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✧ Votre médecin analysera votre fonction rénale par prise de sang car ce médicament peut s'accumuler si les reins filtrent moins bien le sang.
- ✧ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance) et votre carte-alerte fournie dans la boîte du médicament.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.



Innohep®

(tinzaparine)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : ml (= UI) 1x/jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous Innohep®?

La tinzaparine est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Traiter un caillot sanguin lors d'une thrombose ou une embolie pulmonaire.
- ✦ Prévenir la formation de caillots sanguins en cas de facteurs de risque (immobilisation prolongée, chirurgie orthopédique, etc.).


Comment administrer Innohep®?

- ✦ Les injections de tinzaparine s'administrent **sous la peau** (sous-cutané).
- ✦ Vous pouvez apprendre à administrer le médicament vous-même. Si nécessaire, vous pouvez faire appel à un(e) infirmier/ère à domicile pour réaliser l'injection.
- ✦ Injectez le médicament tous les jours à horaire régulier.

TECHNIQUE D'INJECTION


1. Déterminez la zone d'injection (schéma) :

**La paroi abdominale inférieure et le bas du dos sont les sites d'injection principaux recommandés, si nécessaire les sites d'injection en hachuré peuvent être utilisés.*



2. Lavez-vous soigneusement les mains et nettoyez la zone d'injection avec une compresse et du désinfectant.

3. Retirez le capuchon protecteur de la seringue.




4. Il est possible qu'une goutte apparaisse à l'extrémité de l'aiguille. Si c'est le cas, enlevez la goutte avant l'injection en tapotant la seringue, avec l'aiguille dirigée vers le bas.

5. N'éliminez pas la bulle d'air de la seringue.

6. Formez un pli cutané entre le pouce et l'index. Le pli doit être suffisant afin que l'aiguille ne touche pas le muscle (risque d'hématomes). Introduisez l'aiguille sur toute sa longueur.

7. Maintenez le pli cutané durant l'injection, injectez lentement le produit et la bulle d'air. Attendez 5 secondes avant de retirer l'aiguille et de relâcher le pli.



8. Ne massez pas (risque d'hématomes).

9. Mettez la seringue dans un collecteur adapté ou dans un conteneur fermé et solide, que vous rapporterez à votre pharmacie à la fin du traitement.

10. Lavez-vous les mains.

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ✧ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle ;
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

A côté de ses effets bénéfiques, la tinzaparine peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

- ❖ douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ❖ douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

Conservez les seringues dans leur emballage d'origine à **température ambiante** ($< 25^{\circ}\text{C}$).

- ❖ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ❖ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ❖ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement de la prise de tinzaparine, notamment lors de soins avec risque de saignements (soins dentaires, etc.) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ❖ Certains médicaments peuvent augmenter le risque de saignement. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien.
- ❖ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ❖ Gardez toujours avec vous la liste complète et actualisée des médicaments, vitamines, produits naturels et compléments alimentaires que vous prenez.

i

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.



Clexane®

(enoxaparine)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : mg fois par jour
Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous Clexane®?

L'énoxaparine est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

- ✦ Traiter un caillot sanguin lors d'une thrombose ou une embolie pulmonaire.
- ✦ Prévenir la formation de caillots sanguins en cas de facteurs de risque (immobilisation prolongée, chirurgie orthopédique, troubles du rythme cardiaque, etc.).


Comment administrer Clexane®?

- ✦ Les injections d'énoxaparine s'administrent sous la peau (sous-cutané).
- ✦ Vous pouvez apprendre à administrer le médicament vous-même. Si nécessaire, vous pouvez faire appel à un infirmier à domicile pour réaliser l'injection.
- ✦ Injectez le médicament tous les jours à horaire régulier.

TECHNIQUE D'INJECTION


1. Déterminez la zone d'injection (schéma) :

**La paroi abdominale inférieure et le bas du dos sont les sites d'injection principaux recommandés, si nécessaire les sites d'injection en hachuré peuvent être utilisés.*



2. Lavez-vous soigneusement les mains et nettoyez la zone d'injection avec une compresse et du désinfectant.

3. Retirez le capuchon protecteur de la seringue.



4. Il est possible qu'une goutte apparaisse à l'extrémité de l'aiguille. Si c'est le cas, enlevez la goutte avant l'injection en tapotant la seringue, avec l'aiguille dirigée vers le bas.

5. N'éliminez pas la bulle d'air de la seringue.

6. Formez un pli cutané entre le pouce et l'index. Le pli doit être suffisant afin que l'aiguille ne touche pas le muscle (risque d'hématomes). Introduisez l'aiguille sur toute sa longueur.

7. Maintenez le pli cutané durant l'injection, injectez lentement le produit et la bulle d'air. Attendez 5 secondes avant de retirer l'aiguille et de relâcher le pli.



8. Ne massez pas (risque d'hématomes).

9. Mettez la seringue dans un collecteur adapté ou dans un conteneur fermé et solide, que vous rapporterez à votre pharmacie à la fin du traitement.

10. Lavez-vous les mains.

Que faire si vous avez oublié Clexane®?

- ✧ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**

Si vous utilisez Clexane® 1x/jour

- ✧ Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ✧ Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : passez la dose*.

Si vous utilisez Clexane® 2x/jour

- ✧ Si moins de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : prenez immédiatement la dose oubliée.
- ✧ Si plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : passez la dose*.
- ✧ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle ;
- ✧ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Clexane®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'énoxaparine peut présenter des effets secondaires, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ :

- ✧ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ✧ Des hématomes (bleus) fréquents ;

*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

- ✧ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ✧ Des selles de couleur noire ;
- ✧ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ✧ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

CONTACTEZ SANS TARDER UN MÉDECIN SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :

- ✧ douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe ;
- ✧ douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

Comment conserver Clexane®?

Conservez les seringues dans leur emballage d'origine à **température ambiante** (< 25°C).

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✧ Ne modifiez pas la dose prescrite et n'interrompez pas le traitement sans avis médical.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement de la prise d'énoxaparine, notamment lors de soins avec risque de saignements (soins dentaires, etc.) et lors de la programmation d'une intervention chirurgicale.
- ✧ Certains médicaments peuvent augmenter le risque de saignement. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien.
- ✧ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement,

par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.

- ✧ Gardez toujours avec vous la liste complète et actualisée des médicaments, vitamines, produits naturels et compléments alimentaires que vous prenez.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.





Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : comprimés de mg 1 fois par jour
ou schéma mg
Cette dose sera ajustée en cours de traitement sur base des résultats
de l'INR.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous Sintrom®?

L'acénocoumarol est un médicament anticoagulant (fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

Empêcher la formation inappropriée d'un caillot de sang et sa migration dans votre organisme (principalement dans le cerveau-AVC) en cas de fibrillation auriculaire ou de valve cardiaque mécanique.

Comment prendre Sintrom®?

- ❖ Les comprimés d'acénocoumarol doivent être avalés avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ❖ Prenez l'acénocoumarol tous les jours environ à la même heure. Pensez à choisir le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre l'acénocoumarol.
- ❖ Si nécessaire, les comprimés d'acénocoumarol peuvent être coupés ou écrasés*.

QUELLE DOSE DEVEZ-VOUS PRENDRE ?

- ❖ L'effet du médicament varie d'une personne à l'autre. Il faut donc mesurer l'INR (International Normalized Ratio) pour connaître la dose qui vous est adaptée. L'INR est un test sanguin qui évalue l'action anticoagulante de l'acénocoumarol. Plus l'INR est élevé et plus le sang est liquide. C'est votre médecin qui vous précisera la valeur d'INR cible qui vous convient.
- ❖ La fréquence de mesure de l'INR peut varier : de 2 à 3 fois par semaine en début de traitement, 1 fois par mois lorsque la dose est stable, lors de l'ajout ou du retrait d'un médicament, et enfin lors d'une intervention ou d'une hospitalisation.

Que faire si vous avez oublié Sintrom®?

- ❖ **Ne jamais prendre deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- ❖ Si moins de 8 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, prenez immédiatement la dose oubliée*.
- ❖ Si plus de 8 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ❖ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ❖ En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Sintrom®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'acénocoumarol peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ :

- ❖ Des saignements très abondants ou durant plus de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ❖ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ❖ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ❖ Des selles de couleur noire ;
- ❖ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ❖ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement inhabituel, une pâleur, un mal de tête persistant ou un malaise inexpliqué.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est basée sur un consensus d'experts.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC).

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 112 SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :

- ✦ **Faiblesse** : perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire ;
- ✦ **Trouble de la parole** : difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire ;
- ✦ **Trouble de la vision** : problème de vision soudain, même temporaire ;
- ✦ **Mal de tête soudain**, intense et inhabituel.

Comment conserver Sintrom®?

- ✦ Conservez les comprimés à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- ✦ Évitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✦ N'interrompez pas le traitement sans avis médical et ne modifiez pas la dose prescrite.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement de la prise d'acénocoumarol (médecins, pharmaciens, dentistes, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'acénocoumarol. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien.
- ✦ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✦ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.





Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose : comprimés de mg 1 fois par jour
ou schéma mg
Cette dose sera ajustée en cours de traitement sur base des résultats
de l'INR.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous Sintrom®?

L'acénocoumarol est un médicament anticoagulant
(fluidifiant le sang).

DANS VOTRE CAS, IL SERT À :

Détruire ou empêcher la formation d'un caillot de sang
dans une veine et sa migration au niveau des poumons.

Comment prendre Sintrom®?

- ❖ Les comprimés d'acénocoumarol doivent être avalés
avec un verre d'eau, pendant ou en-dehors des repas.
- ❖ Prenez l'acénocoumarol tous les jours environ
à la même heure. Pensez à choisir le moment
de la journée le plus adéquat afin de ne pas
oublier de prendre l'acénocoumarol.
- ❖ Si nécessaire, les comprimés d'acénocoumarol
peuvent être coupés ou écrasés*.

QUELLE DOSE DEVEZ-VOUS PRENDRE ?

- ❖ L'effet du médicament varie d'une personne à l'autre.
Il faut donc mesurer l'INR (International Normalized
Ratio) pour connaître la dose qui vous est adaptée. L'INR
est un test sanguin qui évalue l'action anticoagulante
de l'acénocoumarol. Plus l'INR est élevé et plus
le sang est liquide. C'est votre médecin qui vous
précisera la valeur d'INR cible qui vous convient.
- ❖ La fréquence de mesure de l'INR peut varier : de
2 à 3 fois par semaine en début de traitement, 1
fois par mois lorsque la dose est stable, lors de
l'ajout ou du retrait d'un médicament, et enfin lors
d'une intervention ou d'une hospitalisation.

Que faire si vous avez oublié Sintrom®?

- ❖ **Ne jamais prendre deux doses en même
temps pour compenser la dose oubliée.**
- ❖ Si moins de 8 heures se sont écoulées
depuis l'heure habituelle de prise, prenez
immédiatement la dose oubliée*.
- ❖ Si plus de 8 heures se sont écoulées depuis
l'heure habituelle de prise, passez la dose*.
- ❖ La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- ❖ En cas d'oubli de plus d'une dose,
prévenez votre médecin traitant.

Quels sont les effets indésirables possibles avec Sintrom®?

A côté de ses effets bénéfiques, l'acénocoumarol peut
présenter des effets indésirables, même si tous les
patients n'y sont pas sensibles. L'effet secondaire
principal est un saignement anormal ou important.

Soyez vigilant(e) lors de la manipulation d'objets
coupants, d'activités à risque et de sports violents.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ :

- ❖ Des saignements très abondants ou durant plus
de 15 minutes au niveau du nez, des gencives lors
du brossage des dents, lors d'une coupure ;
- ❖ Des hématomes (bleus) fréquents ;
- ❖ Des vomissements, urines ou selles contenant du sang ;
- ❖ Des selles de couleur noire ;
- ❖ Des petites taches rouges sur la peau ;
- ❖ Une fatigue inhabituelle, un essoufflement
inhabituel, une pâleur, un mal de tête
persistant ou un malaise inexpliqué.

.....
*Cette information n'est pas reprise dans la notice mais est
basée sur un consensus d'experts.

Soyez vigilant(e)

Ce médicament est efficace chez la grande majorité des patients. Toutefois, il persiste un faible risque de développer une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire.

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 112 SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLAR :

- ✧ Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe.
- ✧ Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles pour respirer.

Comment conserver Sintrom®?

- ✧ Conservez les comprimés à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- ✧ Evitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).

Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ Ce traitement vous est prescrit personnellement, ne le donnez pas à une autre personne.
- ✧ N'interrompez pas le traitement sans avis médical et ne modifiez pas la dose prescrite.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement de la prise d'acénocoumarol (médecins, pharmaciens, dentistes, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers à domicile...).
- ✧ Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'acénocoumarol. Ne prenez jamais un nouveau médicament (ou complément alimentaire ou produit à base de plantes), avec ou sans ordonnance, sans en parler au préalable à votre médecin ou votre pharmacien.
- ✧ Il faut faire particulièrement attention avec les médicaments qui augmentent le risque de saignement, par exemple les anti-inflammatoires. En cas de douleur ou de fièvre, préférez le paracétamol.
- ✧ Ayez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels.

Notes personnelles

INFORMATIONS



Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : chuclnamur.be/vos-medicaments.

