

# Vos médicaments

## Anti-infectieux

En tant que patient, et avec l'aide de nos équipes soignantes, vous avez un rôle actif à jouer dans la bonne gestion de vos médicaments.

Retrouvez ici les documents informatifs élaborés par nos pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec nos médecins.



**Ces fiches d'informations sont mises à disposition des patients du CHU UCL Namur. Leur utilisation doit faire l'objet d'un accompagnement par nos équipes médicales, en particulier lors de la première prescription du médicament concerné par la fiche.**

CLIQUEZ SUR LE NOM DU MÉDICAMENT  
POUR ACCÉDER À SA FICHE INFORMATIVE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| CIPROFLOXACINE.....           | 2  |
| LÉVOFLOXACINE.....            | 2  |
| MOXIFLOXACINE.....            | 2  |
| OFLOXACINE.....               | 2  |
| RIFADINE®.....                | 4  |
| VALCYTE®.....                 | 6  |
| VFEND®.....                   | 8  |
| ZITROMAX® AZITHROMYCINE®..... | 12 |
| ZYVOXID®.....                 | 10 |

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.**

- Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

## ☐ Ciprofloxacin

Ciproxine® et génériques

## ☐ Lévofoxacin

Tavanic® et génériques

## ☐ Moxifloxacin

Avelox® et génériques

## ☐ Ofloxacin

Tarivid® et générique

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Médicament : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ fois par jour

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous cet antibiotique?

Les fluoroquinolones sont des antibactériens utilisés pour traiter certaines infections.

## Comment prendre cet antibiotique?

- ✦ Prenez les comprimés avec un verre d'eau, pendant ou en dehors des repas. Évitez de couper ou d'écraser les comprimés car ils ont mauvais goût.
- ✦ Prenez les comprimés à la même heure chaque jour.
- ✦ Ne consommez pas de produits laitiers (lait ou yaourt) ou de jus de fruit enrichis (jus d'orange enrichi en calcium) dans les 2 heures suivant et précédant la prise de ciprofloxacin (Ciproxine® ou générique). Cela empêche le médicament d'être absorbé et pourrait diminuer son efficacité. Cette remarque ne concerne pas les autres antibiotiques listés.
- ✦ Attention lors de la prise de compléments de calcium, de magnésium, de fer, de zinc ou d'aluminium et certains antiacides (Gaviscon®, Maalox®, Antiacid®, Syngel®, Rennie®, etc.) : ils peuvent diminuer l'efficacité de votre antibiotique. Prenez votre antibiotique 2 heures avant ou au moins 4 heures après ces médicaments. Dans certains cas, après accord médical, certains compléments peuvent éventuellement être suspendus pour la durée de l'antibiotique.
- ✦ N'arrêtez pas votre antibiotique et ne modifiez pas la dose sans avis médical, même si vous vous sentez mieux. Sinon, les symptômes de l'infection risqueraient de réapparaître ou vous pourriez développer une résistance bactérienne à l'antibiotique (= risque d'inefficacité).
- ✦ Ne prenez jamais d'antibiotiques de votre propre initiative et ne les partagez pas avec une autre personne sans avis médical.

## Que faire si vous avez oublié cet antibiotique?

- ✦ Prenez le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
- ✦ La dose suivante sera toujours prise à l'heure habituelle. Ne prenez jamais de double dose pour compenser la dose oubliée.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec cet antibiotique?

A côté de leurs effets bénéfiques majeurs, ces antibiotiques peuvent présenter des effets indésirables chez certains patients. Plusieurs sont listés ci-dessous. Le but n'est pas de vous inquiéter, mais bien de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et agir.

- ✦ **Tendinite** : évitez de pratiquer des efforts intensifs pendant la durée du traitement.
- ✦ **Diarrhées** : les antibiotiques peuvent perturber votre flore intestinale, même plusieurs semaines après la fin du traitement. Buvez abondamment (au moins 1,5 litres par jour) pour prévenir la déshydratation.
- ✦ **Nausées, troubles du goût.**
- ✦ **Confusion, vertiges, mal de tête.**
- ✦ **Mycoses** (au niveau buccal ou vaginal).
- ✦ **Eruptions cutanées, sensibilité aux UV** : évitez l'exposition de votre peau au soleil et aux rayons UV durant le traitement. Utilisez une protection solaire efficace.

## Soyez vigilant(e)

**CONTACTEZ SANS TARDER UN MÉDECIN SI UN DE CES SYMPTÔMES SE DÉCLARE :**

- ✦ immédiatement en cas de réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, vertiges, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression thoracique ;
- ✦ dès les premiers signes de douleur ou gonflement d'un tendon. Ou si vous avez eu une tendinite ou rupture d'un tendon dans le passé ;
- ✦ si vous présentez des palpitations ou vous avez l'impression que votre cœur bat irrégulièrement ;
- ✦ en cas de diarrhée sévère ou persistante ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides) ;
- ✦ en cas de sensation de brûlure, picotements, engourdissement et/ou faiblesse musculaire aux pieds, aux jambes, aux mains ou aux bras ;
- ✦ si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Il est recommandé d'éviter ces médicaments.

## Comment conserver cet antibiotique?

- ✦ Conservez les comprimés dans leur emballage d'origine à température ambiante et à l'abri de l'humidité (évitez la salle de bain et la proximité avec la cuisinière).
- ✦ Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants.
- ✦ S'il vous reste des comprimés à la fin du traitement, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les conservez pas.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

Il existe des interférences avec de nombreux médicaments. Quelques exemples sont décrits ci-dessous.

- ✦ Corticoïdes en comprimés ou inhalés (Medrol®, Pulmicort®, etc.) : ils augmentent le risque de tendinite.
- ✦ Anticoagulants oraux (Sintrom®, Marevan®, Marcoumar®) : votre médecin devra contrôler vos paramètres de coagulation.
- ✦ Certains médicaments qui ont un effet sur le rythme du cœur, certains traitements des troubles psychiatriques et antidépresseurs, certains anti-nauséeux (ex : Motilium®), certains antifongiques : il existe un risque de modification de votre rythme du cœur.
- ✦ Antidiabétiques oraux ou insuline : des hypoglycémies ou hyperglycémies pourraient survenir. Surveillez régulièrement votre glycémie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien si vous prenez un médicament listé ci-dessus ou si vous devez prendre un nouveau médicament ou complément alimentaire. Il vérifiera sa compatibilité avec l'antibiotique.

- ✦ Gardez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Si vous consultez un autre professionnel de la santé, il est important de lui signaler que vous prenez cet antibiotique.
- ✦ L'antibiotique est partiellement remboursé dans certaines indications. Si vous rentrez dans ces conditions, votre médecin ajoutera une mention sur l'ordonnance.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# Rifadine®

**150 mg - 300 mg**

(rifampicine)



Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ fois par jour

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous Rifadine®?

Rifadine® est un antibiotique. Il peut être utilisé pour traiter la tuberculose ou certaines infections bactériennes (exemple: infection sur un corps étranger).

## Comment prendre Rifadine®?

- ✦ Une heure avant ou 2 heures après votre repas.
- ✦ Toujours à la même heure.
- ✦ Avalez la gélule entière avec de l'eau. Si vous avez du mal à avaler la gélule, une suspension buvable de rifampicine peut être prescrite par votre médecin. Elle sera préparée par votre pharmacien d'officine.
- ✦ Ne modifiez pas la dose ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

## Que faire si vous avez oublié Rifadine®?

En cas d'une prise par jour :

- ✦ si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de votre prise, prenez immédiatement votre comprimé ;
- ✦ si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de votre prise, ne prenez pas votre comprimé. Ensuite, poursuivez votre traitement à l'heure habituelle.

En cas de deux ou trois prises par jour :

- ✦ ne prenez pas votre comprimé au-delà de 4 heures après l'heure prévue et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Ne prenez jamais une double dose pour compenser votre dose oubliée.

S'il vous arrive fréquemment d'oublier votre traitement, un pilulier et/ou un système d'alarme (exemples : GSM, réveil, calendrier, montre) peuvent vous aider. Demandez conseil auprès de votre pharmacien.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec Rifadine®?

À côté de leurs effets bénéfiques, les médicaments peuvent présenter des effets indésirables chez certains patients. Plusieurs sont listés ci-dessous. Le but n'est pas de vous inquiéter. Il est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et agir.

Ce médicament peut causer une coloration rouge-orangée des urines, de la sueur, de la salive, des larmes et des selles. Cet effet est sans danger et disparaîtra à l'arrêt du traitement.

Si vous portez des lentilles souples, il est recommandé de ne pas en porter durant le traitement, car elles peuvent être tâchées de façon permanente.

### INFORMEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN EN CAS DE D'EFFETS INCOMMODANTS TELS QUE :

- ✦ diarrhée persistante ;
- ✦ ballonnements ;
- ✦ nausées, vomissements incommodes.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN OU LE CENTRE D'URGENCE LE PLUS PROCHE SI VOUS FAITES UNE RÉACTION ALLERGIQUE GRAVE.

Les symptômes que vous pourriez constater sont les suivants :

- ✦ éruption cutanée avec démangeaisons ;
- ✦ gonflement brutal de la gorge, du visage, des lèvres et/ou de la bouche pouvant causer des difficultés à avaler ou respirer ;
- ✦ gonflement brutal des mains, pieds ou chevilles.

Dans des rares cas, la rifampicine peut entraîner des troubles du foie ou des modifications sanguines. Cela sera surveillé par des prises de sang régulières réalisées par votre médecin.

## Comment conserver Rifadine®?

- ✦ Conservez Rifadine® dans son emballage d'origine à température ambiante (< 25°C).
- ✦ Évitez les endroits chauds et humides (exemple : ne pas conserver votre médicament dans la salle de bain).
- ✦ Gardez Rifadine® hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ Rifadine® est un médicament qui peut créer des interactions avec de nombreux autres médicaments, et également jusqu'à 2 semaines après l'arrêt de la Rifadine (notamment en risquant de diminuer leur efficacité).
- ✦ **Exemples**
  - Anticoagulants : Sintrom® (surveillance de l'INR), Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa®.
  - Immunosuppresseurs : Neoral®, Prograft®, Certican® (importance de mesurer la concentration sanguine).
  - Contraceptifs hormonaux oraux : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs) pendant et jusqu'à 7 jours après l'arrêt du traitement.
  - Antiépileptiques : Diphantoine®, Tegretol®.
  - Médicaments traitant une pathologie cardiaque : carvédilol (Kredex®), diltiazem (Progor®), vérapamil (Isoptine®)...
  - Médicaments du diabète : Novonorm®, Unidiamicron®, Glurenorm®...
  - Médicaments contre le VIH.
  - Les corticoïdes, antifongiques, hormones thyroïdiennes, antidépresseurs...
  - Clopidogrel® : l'effet peut être augmenté par Rifadine®.

- ✦ Gardez toujours avec vous la liste complète et actualisée des médicaments, vitamines, produits naturels et compléments alimentaires que vous prenez.
- ✦ Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, produit naturel ou complément alimentaire. Il pourra alors vérifier leur compatibilité.
- ✦ Si vous consultez un autre médecin ou professionnel de la santé, il est important de lui signaler que vous prenez Rifadine®.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).





# Vfend®

(voriconazole)



Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg **2** fois par jour du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

(Durée totale \_\_\_\_\_ jours)

Ensuite \_\_\_\_\_ mg **2** fois par jour

Il se peut que la dose soit modifiée en cours de traitement.

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous Vfend®?

Vfend® est un médicament utilisé pour traiter les infections graves provoquées par des champignons. Ce traitement est généralement mis en route à l'hôpital, par un médecin spécialiste.

## Comment prendre Vfend®?

La dose de Vfend® que vous devez prendre est déterminée par votre médecin en fonction de votre poids et du type d'infection dont vous souffrez. Prenez la dose prescrite 2 fois par jour (matin et soir).

Il est important que vous preniez Vfend® à jeun (en dehors des repas) :

- ✦ pour les comprimés, prenez la dose au moins 1h avant ou 1h après le repas ;
- ✦ pour le sirop, prenez la dose au moins 1h avant ou 2h après le repas. Agitez toujours bien le sirop avant l'emploi ;
- ✦ prenez Vfend® toujours à la même heure ;
- ✦ ne modifiez pas la dose ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

## Que faire si vous avez oublié Vfend®?

**Ne prenez jamais une double dose pour compenser votre dose oubliée !**

En cas d'oubli d'une dose, la prise est possible dans les 6 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée et de reprendre la dose suivante à l'heure habituelle.

S'il vous arrive fréquemment d'oublier votre traitement, un pilulier et/ou un système d'alarme (exemples : GSM, réveil, calendrier, montre) peuvent vous aider. Demandez conseil auprès de votre pharmacien.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec Vfend®?

A côté de leurs effets bénéfiques, les médicaments peuvent présenter des effets indésirables chez certains patients. Plusieurs sont listés ci-dessous. Le but n'est pas de vous inquiéter. Il est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et agir.

### Effets indésirables qui disparaîtront progressivement :

- ✦ nausées, vomissements, diarrhées ;
- ✦ maux de tête.

### INFORMEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN EN CAS DE D'EFFETS INCOMMODANTS TELS QUE :

- ✦ troubles de la vue sévères ou qui persistent (ex : troubles ou modifications de la vision des couleurs) ;
- ✦ troubles du rythme cardiaque ;
- ✦ coups de soleil.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN SI VOUS CONSTATEZ QUE VOTRE FOIE NE FONCTIONNE PEUT-ÊTRE PAS CORRECTEMENT :

- ✦ jaunisse (coloration jaunâtre de la peau ou du blanc de l'œil) ;
- ✦ urines de couleur foncée ;
- ✦ décoloration des selles ;
- ✦ démangeaisons ;
- ✦ douleur abdominale supérieure droite.

### CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN OU LE CENTRE D'URGENCE LE PLUS PROCHE :

- ✦ si votre peau devient rouge et présente des bulles (éruptions cutanées sévères).

Votre médecin vous demandera de faire des examens sanguins régulièrement pour vérifier l'absence de toxicité (cellules sanguines, ions sanguins, fonction hépatique, etc.).

Vfend® vous rend plus sensible au soleil. De ce fait, votre peau peut brûler beaucoup plus rapidement. Dès lors, évitez de vous exposer au soleil. Protégez le mieux possible votre peau en portant des vêtements adaptés (port du chapeau/casquette) et en appliquant de la crème solaire à indice élevé sur les parties exposées (visage, oreilles, mains, pieds).

Comme le Vfend® peut entraîner des troubles de la vision, il est recommandé de réaliser des examens ophtalmologiques avant le début du traitement si celui-ci dure plus d'un mois.

## Comment conserver Vfend®?

- ✦ Vfend® comprimés : à conserver dans son emballage d'origine à température ambiante (< 25°C).
- ✦ Vfend® sirop : avant reconstitution (sous forme de poudre), à conserver au réfrigérateur (2-8°C). Après reconstitution (sous forme liquide), le sirop se conserve 14 jours à température ambiante (< 30°C). Ne pas mettre au réfrigérateur, ni congeler.
- ✦ Évitez de le conserver dans un endroit chaud et/ou humide (exemple : ne pas conserver votre médicament dans la salle de bain).
- ✦ Gardez Vfend® hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ Gardez toujours avec vous la liste complète et actualisée des médicaments, vitamines, produits naturels et compléments alimentaires que vous prenez.
- ✦ Vfend® est un médicament qui peut créer des interférences avec de nombreux autres médicaments. Votre traitement habituel pourrait donc être déséquilibré avec des conséquences néfastes (ex. : risque de surdosage des immunosuppresseurs). C'est pourquoi, avant de commencer le Vfend®, votre médecin s'assurera de l'absence d'incompatibilités dans votre traitement (ou assurera une surveillance particulière si nécessaire).
- ✦ Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, produit naturel ou complément alimentaire. Il pourra alors vérifier leur compatibilité.
- ✦ Si vous consultez un autre médecin ou professionnel de la santé, il est important de lui signaler que vous prenez Vfend®.
- ✦ Vfend® est disponible en pharmacie ouverte au public et est remboursé sous certaines conditions (envoyez le formulaire de demande de remboursement signé par le médecin spécialiste à votre mutuelle).

## Notes personnelles

### INFORMATIONS

**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# Zyvoxid®

600 mg

(linézolide)



Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : 1 comprimé de 600 mg 2 fois par jour

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous Zyvoxid®?

Zyvoxid® est un antibiotique. Il ne peut être instauré qu'en milieu hospitalier, après avis d'un spécialiste.

**Il n'est disponible que dans une pharmacie d'hôpital.**

## Comment prendre Zyvoxid®?

- ✦ Zyvoxid® peut être pris avant, pendant ou après un repas.
- ✦ Avalez le comprimé avec de l'eau (si nécessaire, vous pouvez écraser les comprimés).
- ✦ Prenez Zyvoxid® toujours aux mêmes heures (matin et soir), avec un intervalle de 12 heures entre deux prises.
- ✦ Durant votre traitement (et les 48 heures qui suivent son arrêt), évitez de consommer de grandes quantités de banane, chocolat, alcool, fromages bien faits (Camembert, Bleu, Roquefort, etc.). Evitez absolument les aliments qui n'ont pas été conservés correctement.
- ✦ Ne modifiez pas la dose ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

## Que faire si vous avez oublié Zyvoxid®?

- ✦ Prenez la dose oubliée dès que possible.
- ✦ Ensuite, prenez la dose suivante 12 heures plus tard et continuez à prendre vos doses toutes les 12 heures.
- ✦ Ne prenez jamais une double dose pour compenser votre dose oubliée.
- ✦ S'il vous arrive fréquemment d'oublier votre traitement, un pilulier et/ou un système d'alarme (exemples : GSM, réveil, calendrier, montre) peuvent vous aider. Demander conseil auprès de votre pharmacien.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec Zyvoxid®?

A côté de leurs effets bénéfiques, les médicaments peuvent entraîner des effets indésirables chez certains patients. Plusieurs sont listés ci-dessous. Le but n'est pas de vous inquiéter. Il est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et agir.

### INFORMEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN EN CAS DE D'EFFETS INCOMMODANTS TELS QUE :

- ✦ diarrhées persistantes ;
- ✦ nausées ;
- ✦ mal de tête ;
- ✦ fatigue ;
- ✦ goût métallique.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN PRESCRIPTEUR PAR L'INTERMÉDIAIRE DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT SI VOUS CONSTATEZ LES EFFETS INDÉSIRABLES SUIVANTS :

- ✦ crampes ;
- ✦ douleurs abdominales importantes ;
- ✦ fatigue anormale ;
- ✦ perte complète d'appétit ;
- ✦ fourmillements ;
- ✦ hématomes.

Si vous recevez plus de 2 semaines de traitement, un contrôle régulier par prise de sang s'impose. Ceci permettra de suivre notamment une éventuelle diminution des plaquettes sanguines et des globules rouges.

## Comment conserver Zyvoxid®?

- ✦ Conservez Zyvoxid® dans son emballage d'origine à température ambiante (< 25°C).
- ✦ Evitez les endroits chauds et humides (exemple : ne pas conserver votre Zyvoxid® dans la salle de bain).
- ✦ Gardez le Zyvoxid® hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ Zyvoxid® est un médicament qui peut créer des interactions avec de nombreux autres médicaments.
- ✦ **Exemples**
  - Les médicaments antidépresseurs, ou utilisés contre les douleurs neuropathiques et les troubles du sommeil (Sipralax®, Redomex®, Cymbalta®, Prozac®, Seroxat®, Trazodone, Eflexor®, Serlain®, Fluoxétine®, Sertraline®, Paroxétine®...).
  - Médicaments contre la douleur (Tradonal®, Contramal®, Durogesic®...).
  - Médicaments contre les nausées/ vomissements (Ondansétron, Zofran®, Primperan®...).
  - Médicaments traitant un rhume ou une grippe et contenant un décongestionnant.
  - Médicaments utilisés pour dilater les bronches (Ventolin®, Duovent®...).
  - Médicaments de la maladie de Parkinson.
  - Médicaments contre la migraine (Imitrex®, Zomig®...).
  - Dextrométhorphan (utilisé contre la toux).
  - Risperidone (Risperdal®), clozapine, olanzapine (Zyprexa®), lévomépromazine (Nozinan®).
  - Méthylphénidate (Rilatine®).
  - Lithium (Camcolit®).
- ✦ Gardez toujours avec vous la liste complète et actualisée des médicaments, vitamines, produits naturels et compléments alimentaires que vous prenez.
- ✦ Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, produit naturel ou complément alimentaire. Il pourra alors vérifier leur compatibilité.
- ✦ Si vous consultez un autre médecin ou professionnel de la santé, il est important de lui signaler que vous prenez Zyvoxid®.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).



