

# AMIKACINE AMUKIN®

500mg ou 1 g

(amikacine)

Nom du patient : .....

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : .....

Dose : .....flacon(s) de .....g .....fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : .....

Durée/Date de fin : .....

## Pourquoi prenez-vous l'Amikacine?

L'Amikacine est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment allez-vous recevoir l'Amikacine?

- ✦ L'Amikacine est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer l'Amikacine une fois par jour à votre domicile. **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**
- ✦ Les flacons d'Amikacine sont prêts à l'emploi. Ils ne doivent pas être dilués.
- ✦ L'infirmier(e) connectera le flacon à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine **pendant 30 à 60 minutes.**

## Quels sont les effets indésirables possibles avec l'Amikacine?

A côté de ses effets bénéfiques, l'Amikacine peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de l'Amikacine. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ Acouphènes, grondements dans les oreilles, diminution ou perte d'audition.
- ✦ Vertiges, étourdissements.
- ✦ Engourdissements, picotements, contraction des muscles ou faiblesse musculaire.
- ✦ Nausées, vomissements.
- ✦ Toxicité aux reins : diminution ou absence d'urine. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale avec des prises de sang.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - grondements dans les oreilles et diminution ou perte d'audition, vertiges ;
  - engourdissements, picotements, contraction des muscles ou difficultés à respirer ou faiblesse musculaire ;
  - absence d'urine ;
  - réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression à la poitrine, gonflement de ganglions.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

