

MEROPENEM MERONEM®

1 g

(meropenem)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :flacon(s) degfois par jour

par voie intraveineuse

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous le Meropenem?

Le Meropenem est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

Comment prendre le Meropenem?

- ✦ Le Meropenem est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer le Meropenem une ou deux fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

1. RECONSTITUTION ET DILUTION

L'infirmier(e) insérera, d'une part, une aiguille de transfert bidirectionnelle dans l'opercule désinfecté du flacon d'antibiotique et d'autre part, dans l'orifice de connexion de la poche de perfusion (NaCl 0,9% 100 ou 250 mL).

Il/elle fera pression sur la poche pour que la solution dissolve la poudre du flacon. Il/elle agitera le flacon jusqu'à dissolution complète.

Par pression, l'infirmier(e) transférera la solution dissoute dans la poche en maintenant la poche vers le bas.

L'infirmier(e) retirera l'aiguille de transfert et insérera la trousse à perfusion. Ensuite, il/elle homogénéisera la poche (dans cet ordre, pour éviter la perte de produit).



2. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 15 à 30 minutes.

Quels sont les effets indésirables possibles avec la Témocilline?

A côté de ses effets bénéfiques, le Meropenem peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux du Meropenem. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois nausées, vomissements, douleurs au ventre, constipation.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**, urticaire.
- ✦ Maux de tête, confusion.
- ✦ Picotement dans les mains.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.

Soyez vigilant(e)

CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
 - en cas de réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression à la poitrine ;
 - éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides).
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexplicé.

