

NEGABAN®

1 OU 2 g

(témocilline)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :flacon(s) degfois par jour

par voie intraveineuse

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous la Témocilline?

La Témocilline est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

Comment prendre la Témocilline?

- ✦ La Témocilline est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Témocilline une ou deux fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

1. RECONSTITUTION ET DILUTION

L'infirmier(e) insérera, d'une part, une aiguille de transfert bidirectionnelle dans l'opercule désinfecté du flacon d'antibiotique et d'autre part, dans l'orifice de connexion de la poche de perfusion (NaCl 0,9% ou Glucose 5% 100 mL).

Il/elle fera pression sur la poche pour que la solution dissolve la poudre du flacon. Il/elle agitera le flacon jusqu'à dissolution complète.

Par pression, l'infirmier(e) transférera la solution dissoute dans la poche en maintenant la poche vers le bas.

L'infirmier(e) retirera l'aiguille de transfert et insérera la trousse à perfusion. Ensuite, il/elle homogénéisera la poche (dans cet ordre, pour éviter la perte de produit).



2. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 à 40 minutes.

Quels sont les effets indésirables possibles avec la Témocilline?

A côté de ses effets bénéfiques, la Témocilline peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Témocilline. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**.
- ✦ **Diarrhées**.
- ✦ **Confusion**.

Soyez vigilant(e)

CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
 - en cas de réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression de la poitrine ;
 - en cas de réaction d'hypersensibilité retardée (parfois plus de 48h après le début du traitement) = éruption cutanée avec démangeaisons, fièvre, tâches sur la peau ne s'effaçant pas à la pression, douleurs aux muscles ;
 - en cas de convulsions.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires (substances translucides) dans les selles.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

