

TARGOCID®

400 mg

(teicoplanine)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Dose :flacon(s) demgfois par jour

par voie intraveineuse

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous la Teicoplanine?

La Teicoplanine est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

Comment prendre la Teicoplanine?

- ✦ La Teicoplanine est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Teicoplanine une fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**
- ✦ Le médecin suivra les concentrations du médicament dans le sang car la dose efficace de Teicoplanine peut varier d'une personne à l'autre. Elle est susceptible d'être modifiée au cours du traitement en fonction des résultats.

1. RECONSTITUTION

Après désinfection du flacon, l'infirmier(e) y ajoutera **lentement** la totalité du solvant fourni pour la reconstitution. Il/elle fera tourner **délicatement*** le flacon entre ses mains jusqu'à dissolution complète de la poudre (couleur jaunâtre à jaune foncé).

*Si la solution devient mousseuse, elle doit être laissée au repos pendant environ 15 minutes.

2. DILUTION

L'infirmier(e) prélèvera la solution du flacon avec une seringue. La quantité prélevée dépend de la dose sachant que 3 mL = 400 mg. Il/elle désinfectera le site d'injection d'une poche de perfusion (NaCl 0,9% ou glucose 5% 100mL) puis y injectera le contenu de la seringue. Il/elle homogénéisera ensuite la poche.

3. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 minutes.

Quels sont les effets indésirables possibles avec la Teicoplanine?

A côté de ses effets bénéfiques, la Teicoplanine peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Teicoplanine. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois nausées, vomissements.
- ✦ Maux de tête.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**.
- ✦ Acouphène, diminution ou **perte d'audition**, vertiges.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.
- ✦ Diminution ou absence d'urine (toxicité des reins). Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale avec des prises de sang.

