

# ZINFORO®

## 600 mg

(Ceftaroline)

Nom du patient : .....

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : .....

Dose : .....flacon(s) de **600** .....mg .....**2** .....fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : .....

Durée/Date de fin : .....

## Pourquoi prenez-vous Ceftaroline?

La Ceftaroline est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment prendre la Ceftaroline?

- ✦ La Ceftaroline est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Ceftaroline deux fois par jour à votre domicile. Il/elle effectuera toutes les manipulations.

### 1. RECONSTITUTION



Après désinfection du flacon, l'infirmier(e) y ajoutera **20 mL d'eau pour injection**. Il/elle agitera doucement le flacon jusqu'à dissolution complète (coloration jaune pâle).

### 2. DILUTION



L'infirmier(e) prélèvera ensuite la dose adéquate du flacon avec une seringue. Il/elle désinfectera le site d'injection d'une poche de perfusion (NaCl 0,9% ou Glucose 5% 100 mL) puis y injectera le contenu de la seringue. Il/elle homogénéisera ensuite la poche.

### 3. ADMINISTRATION



L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine **pendant 60 minutes** (cette longue durée permet de réduire les effets indésirables).

## Quels sont les effets indésirables possibles avec la Ceftaroline ?

A côté de ses effets bénéfiques, la Ceftaroline peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Ceftaroline. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois nausées, douleurs au ventre
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**, urticaire
- ✦ Maux de tête, vertiges, désorientation, confusion
- ✦ Réactions liées à la perfusion : rougeur ou douleur au site d'injection, bouffées de chaleur

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement, en cas d'éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires (substances translucides) dans les selles.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C)
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

