

Cancidas[®], Caspofungine[®]

50 ou 70 mg

(Caspofungine)

Nom du patient :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Administration continue par voie intraveineuse par une
pompe élastomérique (INFUSOR/FOLFUSOR LV10[®]) en
hospitalisation à domicile

Dose : 1 flacon de mg 1 fois par jour par voie
intraveineuse.

Date de début :

Durée/Date de fin :

Pourquoi prenez-vous la Caspofungine?

La Caspofungine est un antifongique utilisé pour traiter
certaines infections causées par des champignons.

Comment prendre la Caspofungine ?

- ✦ La Caspofungine est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Caspofungine une fois par jour à votre domicile. Il/elle effectuera toutes les manipulations.

1. RECONSTITUTION



Après désinfection du flacon, l'infirmier(e) y ajoutera **10,5 mL d'eau pour injection**. Il/elle agitera doucement le flacon jusqu'à dissolution complète.

2. DILUTION



L'infirmier(e) prélèvera ensuite 10 mL* du flacon avec une seringue. Il/elle désinfectera le site d'injection d'une poche de perfusion (NaCl 0,9% 250 mL) puis y injectera le contenu de la seringue. Il/elle homogénéisera ensuite la poche.

*On prélève 10 mL sur les 10,5 mL car le flacon est légèrement surdosé.

3. ADMINISTRATION



L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine **pendant 1 heure** (cette longue durée permet de limiter les effets indésirables).

Quels sont les effets indésirables possibles avec la Caspofungine ?

A côté de ses effets bénéfiques, la Caspofungine peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Caspofungine[®]. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Maux de tête**, vertiges
- ✦ **Nausées/vomissements**, diarrhées, douleurs au ventre
- ✦ **Éruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau) et démangeaisons.
- ✦ **Réactions liées à la perfusion** : rougeur ou douleur au site d'injection, bouffées de chaleur, frissons (surtout si perfusion trop rapide)
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.

SOYEZ VIGILANT(E)

CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement, en cas d'éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C)
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexplicable.

