

# Diflucan<sup>®</sup>, Fluconazole 200 mg ou 400 mg

(Fluconazole)

Nom du patient : .....

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : .....

Administration continue par voie intraveineuse par une pompe élastomérique (INFUSOR/FOLFUSOR LV10<sup>®</sup>) en hospitalisation à domicile

Dose : 1 perfusion de ..... mg 1 fois par jour par voie intraveineuse.

Date de début : .....

Durée/Date de fin : .....

## Pourquoi prenez-vous le fluconazole?

Le fluconazole est un antifongique utilisé pour traiter certaines infections causées par des champignons.

## Comment allez-vous recevoir le fluconazole ?

- ✦ Le fluconazole est administré par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer le fluconazole une fois par jour à votre domicile. **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**
- ✦ Les perfusions de fluconazole sont **prêtes à l'emploi.**
- ✦ L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant **10 à 30 minutes** (maximum 10 mL par minute).

## Quels sont les effets indésirables possibles avec le fluconazole ?

A côté de ses effets bénéfiques, le fluconazole peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. En général, le fluconazole est bien toléré.

Voici les effets indésirables principaux du fluconazole. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois des nausées et vomissements
- ✦ **Maux de tête**
- ✦ **Vertiges, étourdissements** : ne pas conduire si ces symptômes apparaissent. Rarement, des crises d'épilepsie peuvent survenir.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau)
- ✦ **Troubles du rythme cardiaque** : votre médecin réalisera un électrocardiogramme avant et/ou pendant votre traitement si vous êtes à risque.

## **SOYEZ VIGILANT(E)**

### **CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :**

- ✦ En cas d'éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ Si vous subissez une crise d'épilepsie.
- ✦ Si vous ressentez des palpitations accompagnées d'étourdissements, de vertiges, syncopes, convulsions, ...
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

